

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

充血・疲れ目に

バイシン[®]
Visine[®]

〈目薬〉

第2類医薬品

バイシンは、充血クリア成分「塩酸テトラヒドロソリン」配合で、充血や目の疲れに効きます。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人
 - (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (4) 次の症状のある人
はげしい目の痛み
 - (5) 次の診断を受けた人
緑内障
2. 次の場合は、ただちに使用を中止し、この添付文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。
 - (1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

- (2) 目のかすみが改善されない場合
- (3) 5～6日間使用しても症状がよくなるらない場合

【効能・効果】

結膜充血、目の疲れ、眼病予防（水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど）、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感、目のかすみ（目やにの多いときなど）

【用法・用量】

1回1～2滴を1日3～4回点眼してください。

次の注意事項を守ってください。

- (1) 過度に使用すると、異常なまぶしさを感じたり、かえって充血を招くことがあります。
 - (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
 - (3) 容器の先をまぶた、まつ毛に触れさせないでください。また、混濁したものは使用しないでください。
- ※ (4) ソフトコンタクトレンズ及びO₂コンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- (5) 点眼用にのみ使用してください。

【成分・分量】


バイシン10mL中の成分、分量及びその主なはたらきは次のとおりです。

成分	分量	はたらき
塩酸テトラヒドロゾリン	5mg	末梢血管収縮作用により結膜の充血を取り除きます。

添加物として、ホウ酸、ホウ砂、塩化ベンザルコニウム、エデト酸Na、pH調整剤、等張化剤を含有します。

【保管及び取扱い上の注意】


- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
特に自動車等、高温になる所に放置しないでください。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わります)
- (4) 他の人と共用しないでください。
- (5) 使用期限(外箱及び容器に記載)のすぎた製品は使用しないでください。



【包装】

バイシン：10mL

キャップシールの開け方



矢印のところからキャップシールをはがし(①)、
ミシン目によって矢印の方向にキャップシールを取り去ってください(②)。シールの切れ端が残った場合には、それを切り取ってからご使用ください。
製品本体部のシールを破らないようにご注意ください。

お願い：バイシンは安全キャップシールを採用しています。万一、シールがはがれている場合は、ご使用にならないようお願い申し上げます。

※※

本製品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

お客様相談室： ☎ 0120-834389

受付時間： 9:00～17:00 (土、日、祝日を除く)

※※※ 製造販売元

ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

〒101-0065 東京都千代田区西神田3-5-2