

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

花粉、ハウスダスト等による目のかゆみ・充血に 〈目薬〉

バイシ[®]アルメディモイスト Visine[®] Almedi Moist

クロモグリク酸ナトリウム配合 〈アレルギー専用目薬〉

バイシアルメディモイストは、抗アレルギー剤「クロモグリク酸ナトリウム」と抗ヒスタミン剤「マレイン酸クロルフェニラミン」を配合し、花粉やハウスダスト等による目のアレルギー症状（目のかゆみ、充血、なみだ目等）を改善するアレルギー専用目薬です。「タウリン」「ビタミンB6」が目に栄養を与え新陳代謝を促進します。また、「ヒアルロン酸ナトリウム（製剤の粘稠化剤）」を配合した、うるおい感のあるやわらかなさし心地です。



使用上の注意



してはいけないこと

【守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります】
点鼻薬と併用する場合には、使用後、乗り物又は機械類の運転操作をしないでください。（眠気があらわれることがあります）



相談すること

- 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人
 - 減感作療法等、アレルギーの治療を受けている人
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - 次の症状のある人
 - はげしい目の痛み
 - 次の診断を受けた人
 - 緑内障
 - アレルギーによる症状か他の原因による症状かはっきりしない人
特に次のような場合はアレルギーによるものとは断定できないため、使用前に医師に相談してください。
 - 片方の目だけに症状がある場合
 - 目の症状のみで、鼻には症状がみられない場合
 - 視力にも影響がある場合
- 次の場合は、ただちに使用を中止し、この添付文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。
 - 使用後、次の症状があらわれた場合

| 関係部位 | 症 状 |
|------|--------------|
| 皮 膚 | 発疹・発赤、かゆみ |
| 目 | 充血、かゆみ、はれ、痛み |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合はただちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称 | 症 状 |
|-------------|------------------------------------------------|
| アナフィラキシー様症状 | 使用後すぐに息苦しさ、浮腫（咽喉、まぶた、鼻粘膜、口唇等）、じんましん等の症状があらわれる。 |

- 目のかすみが改善されない場合
- 2日間使用しても症状の改善がみられない場合
- 症状の改善がみられても2週間を超えて使用する場合は、医師又は薬剤師にご相談ください。

【効能・効果】

花粉、ハウスダスト（室内塵）等による次のような目のアレルギー症状の緩和：
目のかゆみ、目の充血、目のかすみ（目やにの多いとき等）、なみだ目、
異物感（ココロコする感じ）

【用法・用量】

1回1～2滴を1日4～6回点眼してください。
2日間使用しても症状の改善がみられない場合には、医師又は薬剤師に相談し
てください。

次の注意事項を守ってください。

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 容器の先をまぶた、まつ毛に触れさせないでください。
また、混濁したものは使用しないでください。
- (4) コンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- (5) 点眼用에만使用してください。

【成分・分量】


バイシンアルメディモイスト 10mL 中の成分、分量及びその主なはたらきは次のとおりです。

| 成分 | 分量 | はたらき |
|-----------------------|-------|------------------------------------|
| クロモグリク酸ナトリウム | 100mg | アレルギー症状を引き起こす誘発物質の放出を抑えます。 |
| マレイン酸 クロルフェニラミン | 1.5mg | 抗ヒスタミン作用により、アレルギー性の目のかゆみ・充血を改善します。 |
| アミノエチルスルホン酸 (タウリン) | 100mg | 目の細胞に栄養を与え、新陳代謝を促進します。 |
| 塩酸ピリドキシン（ビタミンB6） | 10mg | |

添加物として、ヒアルロン酸 Na、グリセリン、ステアリン酸ポリオキシル、プロピレングリコール、ホウ酸、エデト酸 Na、塩化ベンザルコニウム、dl-カンフル、d-ボルネオール、ユーカリ油、pH調整剤を含有します。

【保管及び取扱い上の注意】


- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
特に自動車等、高温になる所に放置しないでください。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります）
- (4) 他の人と共用しないでください。
- (5) 使用期限（外箱及び容器に記載）のすぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても開封後はなるべく早くご使用ください。



【包装】

バイシンアルメディモイスト：10mL

キャップシールの開け方



矢印のところからキャップシールをはがし①、ミシン目にそって矢印の方向にキャップシールを取り去ってください②。シールの切れ端が残った場合には、それを切り取ってからご使用ください。
製品本体部のシールを破らないようご注意ください。

お願い：バイシンアルメディモイストは安全キャップシールを採用しています。万一、シールがはがれている場合は、ご使用にならないようお願い申し上げます。

本製品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

お客様相談室： ☎ 0120-834389

受付時間： 9:00～17:00（土、日、祝日を除く）

【販売元】 **ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社**

〒101-0065 東京都千代田区西神田3-5-2

【製造販売元】

東亜薬品株式会社

富山県富山市水橋開発277番10

© J&J KK 2007
® 登録商標
1AA
90337